

第6章 多項式時間計算可能性の分析

1/14

6.1. 多項式時間還元可能性

定義6.1:

A と B を任意の集合とする.

(1) 関数 $h: A \rightarrow B$: **多項式時間還元** (polynomial-time reduction)

- \Leftrightarrow $\begin{cases} \text{(a) } h \text{ は } \Sigma^* \text{ から } \Sigma^* \text{ への全域的関数} \\ \text{(b) } x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ \text{(c) } h \text{ は多項式時間計算可能.} \end{cases}$

(2) A から B への多項式時間還元が存在するとき,

A は B へ**多項式時間還元可能**という (polynomial time reducible).

このとき, 次のように書く:

$$A \leq_m^p B$$

Chapter 6. Analysis on Polynomial-Time Computability

1/14

6.1. Polynomial-time Reducibility

Def.6.1:

Let A and B be arbitrary sets.

(1) function $h: A \rightarrow B$: **polynomial-time reduction**

- \Leftrightarrow $\begin{cases} \text{(a) } h \text{ is a total function from } \Sigma^* \text{ onto } \Sigma^* \\ \text{(b) } x \in \Sigma^* [x \in A \leftrightarrow h(x) \in B] \\ \text{(c) } h \text{ is polynomial-time computable.} \end{cases}$

(2) When there is a polynomial-time reduction from A to B , we say A is **polynomial-time reducible to B** .

Then, we denote by

$$A \leq_m^p B$$

6.2. 多項式時間還元可能性に基づく完全性

7/14

6.2.1. 完全性の定義とその基本的性質

定義6.2: 計算量クラス C に対し, 集合 A が次の条件を満たすとき, それを $(\leq_m^p$ の下で) C -**完全**という.

- (a) $\forall L \in C [L \leq_m^p A]$
 (b) $A \in C$

補注: 条件(a)を満たす集合は C -**困難**.

例6.5. クラス \mathcal{NP} の完全集合の例

3SAT, SAT, ExSAT, DHAM, KNAP, BIN, VCなど
 クラス \mathcal{EXP} の完全集合
 EVAL-IN-E, HALT-IN-Eなど

6.2. Completeness based on Polynomial-time Reducibility

7/14

6.2.1. Definition of Completeness and its Basic Properties

Def.6.2: For a class C , if a set A satisfies the following conditions, then it is called C -**complete** (under \leq_m^p)

- (a) $\forall L \in C [L \leq_m^p A]$
 (b) $A \in C$

Note: Sets satisfying the condition (a) are called C -**hard**.

Ex.6.5. Examples of \mathcal{NP} -complete sets

3SAT, SAT, ExSAT, DHAM, KNAP, BIN, VC, etc
 \mathcal{EXP} -complete sets
 EVAL-IN-E, HALT-IN-E, etc.

定理6.3. 任意の C -困難集合(含: C -完全集合) A に対し,

- (1) $A \in \mathcal{P} \rightarrow C \subseteq \mathcal{P}$ 対偶は $C \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$
 (2) $A \in \mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{NP}$ 対偶は $C \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow A \notin \mathcal{NP}$
 (3) $A \in \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ 対偶は $C \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$
 (4) $A \in \mathcal{EXP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{EXP}$ 対偶は $C \not\subseteq \mathcal{EXP} \rightarrow A \notin \mathcal{EXP}$

証明:

(1) B を任意の C 集合とすると, A は C -困難だから,

$B \leq_m^p A$ 一方, $A \in \mathcal{P}$ の仮定より, $B \in \mathcal{P}$ (定理6.1)

(2), (3), (4)も同様

Theorem 6.3. For any C -hard (or C -complete) set A ,

- (1) $A \in \mathcal{P} \rightarrow C \subseteq \mathcal{P}$ CP: $C \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$
 (2) $A \in \mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{NP}$ CP: $C \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow A \notin \mathcal{NP}$
 (3) $A \in \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ CP: $C \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$
 (4) $A \in \mathcal{EXP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{EXP}$ CP: $C \not\subseteq \mathcal{EXP} \rightarrow A \notin \mathcal{EXP}$

Proof:

CP: contraposition

(1) Let B be any C -set. Then, since A is C -hard,

$B \leq_m^p A$ and by the assumption $A \in \mathcal{P}$ we have $B \in \mathcal{P}$ (Th. 6.1)

(2), (3), (4) are similar.

9/14

9/14

定理6.3. 任意のC-困難集合(含:C-完全集合)Aに対し,
 (1) $A \in \mathcal{P} \rightarrow C \subseteq \mathcal{P}$ 対偶は $C \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$
 (2) $A \in \mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{NP}$ 対偶は $C \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow A \notin \mathcal{NP}$
 (3) $A \in \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ 対偶は $C \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$
 (4) $A \in \mathcal{EXP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{EXP}$ 対偶は $C \not\subseteq \mathcal{EXP} \rightarrow A \notin \mathcal{EXP}$

例6.6. 定理6.3の意味(クラスNP)
 AをNP-完全集合とする.

定理6.3(1)の対偶より,
 $\mathcal{NP} \neq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$

定理6.3(3)の対偶と定理5.9(1)の対偶より,
 $A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$

つまり, NP-完全集合は $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ である限り,
 多項式時間では認識できない.

定理5.9.

(1) $\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$

Theorem 6.3. For any C-hard (or C-complete) set A,

- (1) $A \in \mathcal{P} \rightarrow C \subseteq \mathcal{P}$ CP: $C \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$
- (2) $A \in \mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{NP}$ CP: $C \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow A \notin \mathcal{NP}$
- (3) $A \in \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow C \subseteq \text{co-}\mathcal{NP}$ CP: $C \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$
- (4) $A \in \mathcal{EXP} \rightarrow C \subseteq \mathcal{EXP}$ CP: $C \not\subseteq \mathcal{EXP} \rightarrow A \notin \mathcal{EXP}$

Theorem 5.9.

(1) $\mathcal{NP} \subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow \mathcal{NP} = \text{co-}\mathcal{NP}$

Ex.6.6: Meaning of Theorem 6.3(class NP)


Let A be NP-complete set.

By the contraposition of Theorem 6.3(1) we have
 $\mathcal{NP} \neq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$


By the contraposition of Theorem 6.3(3) and that of Theorem 5.9(1),
 $A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$

That is, NP-complete sets are NP-sets that cannot be recognized in polynomial time unless $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$.

NP-完全集合は $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$ である限り, $\mathcal{NP} \cap \text{co-}\mathcal{NP}$ には入らない NP集合である.



NP-complete sets are NP-sets that do not belong to $\mathcal{NP} \cap \text{co-}\mathcal{NP}$ unless $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$.



例6.7. 定理6.3の意味(クラスEXP)

DをEXP-完全集合とする.

定理6.3(1)の対偶($C \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$, ここでは $\mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow D \notin \mathcal{P}$)
 $\mathcal{P} \neq \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{P} (\because \mathcal{P} \subseteq \mathcal{EXP}) \rightarrow D \notin \mathcal{P}$

定理6.3(2)の対偶($C \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow A \notin \mathcal{NP}$,
 ここでは $\mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow D \notin \mathcal{NP}$)

$\mathcal{NP} \neq \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{NP} (\because \mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}) \rightarrow D \notin \mathcal{NP}$

定理6.3(3)の対偶($C \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$,
 ここでは $\mathcal{EXP} \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow D \notin \text{co-}\mathcal{NP}$)

$\text{co-}\mathcal{NP} \neq \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{EXP} \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow D \notin \text{co-}\mathcal{NP}$

ところが定理5.7から $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{EXP}$ であるから, $D \notin \mathcal{P}$.

EXP-完全集合は多項式時間では計算不可能.

Ex. 6.7. Meaning of Theorem 6.3(class EXP)

Let D be an EXP-complete set.

Contraposition of Theorem 6.3(1)

($C \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow A \notin \mathcal{P}$, where $\mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{P} \rightarrow D \notin \mathcal{P}$)

$\mathcal{P} \neq \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{P} (\because \mathcal{P} \subseteq \mathcal{EXP}) \rightarrow D \notin \mathcal{P}$

Contraposition of Theorem 6.3(2)($C \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow A \notin \mathcal{NP}$,

Here, $\mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{NP} \rightarrow D \notin \mathcal{NP}$)

$\mathcal{NP} \neq \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{EXP} \not\subseteq \mathcal{NP} (\because \mathcal{NP} \subseteq \mathcal{EXP}) \rightarrow D \notin \mathcal{NP}$

Contraposition of Theorem 6.3(3)($C \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow A \notin \text{co-}\mathcal{NP}$,

here, $\mathcal{EXP} \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow D \notin \text{co-}\mathcal{NP}$)

$\text{co-}\mathcal{NP} \neq \mathcal{EXP} \rightarrow \mathcal{EXP} \not\subseteq \text{co-}\mathcal{NP} \rightarrow D \notin \text{co-}\mathcal{NP}$

But, by Theorem 5.7, since we know $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{EXP}$, we have $D \notin \mathcal{P}$.

EXP-complete sets are not computable in polynomial time.

13/14

定理6.4. A : 任意の C -完全集合

すべての集合 B に対し、

(1) $A \leq_m^p B \rightarrow B$ は C -困難.

(2) $A \leq_m^p B \wedge B \in C \rightarrow B$ は C -完全.

証明:
 定義6.2より, $\forall L \in C[L \leq_m^p A]$
 定理6.2より, $L \leq_m^p A \wedge A \leq_m^p B \rightarrow L \leq_m^p B$
 したがって, $\forall L \in C[L \leq_m^p B]$

すなわち, B は C -困難.

13/14

Theorem 6.4. A : any C -complete set

For any set B we have

(1) $A \leq_m^p B \rightarrow B$ is C -hard.

(2) $A \leq_m^p B \wedge B \in C \rightarrow B$ is C -complete.

Proof:
 By Def. 6.2 $\forall L \in C[L \leq_m^p A]$
 By Theorem 6.2, $L \leq_m^p A \wedge A \leq_m^p B \rightarrow L \leq_m^p B$
 Therefore, $\forall L \in C[L \leq_m^p B]$
 That is, B is C -hard.

14/14

$\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\mathcal{C} \equiv \{L: L \text{ は } \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\text{-完全}\}$
 $\mathcal{N}\mathcal{P}\mathcal{C} \equiv \{L: L \text{ は } \mathcal{N}\mathcal{P}\text{-完全}\}$
 とすると, 次の定理が成り立つ.

定理6.5.

(1) $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\mathcal{C} \cap \mathcal{P} = \emptyset$
 (2) $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P} - (\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\mathcal{C} \cup \mathcal{P}) \neq \emptyset$

定理6.6: $\mathcal{P} \neq \mathcal{N}\mathcal{P}$ を仮定すると

(1) $\mathcal{N}\mathcal{P}\mathcal{C} \cap \mathcal{P} = \emptyset$
 (2) $\mathcal{N}\mathcal{P} - (\mathcal{N}\mathcal{P}\mathcal{C} \cup \mathcal{P}) \neq \emptyset$

14/14

$\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\mathcal{C} \equiv \{L: L \text{ is } \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\text{-complete}\}$
 $\mathcal{N}\mathcal{P}\mathcal{C} \equiv \{L: L \text{ is } \mathcal{N}\mathcal{P}\text{-complete}\}$
 Then, we have the following theorems.

Theorem 6.5.

(1) $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\mathcal{C} \cap \mathcal{P} = \emptyset$
 (2) $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P} - (\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}\mathcal{C} \cup \mathcal{P}) \neq \emptyset$

Theorem 6.6: Assuming $\mathcal{P} \neq \mathcal{N}\mathcal{P}$

(1) $\mathcal{N}\mathcal{P}\mathcal{C} \cap \mathcal{P} = \emptyset$
 (2) $\mathcal{N}\mathcal{P} - (\mathcal{N}\mathcal{P}\mathcal{C} \cup \mathcal{P}) \neq \emptyset$

1/11

6.2.2. 完全性の証明

($\mathcal{N}\mathcal{P}$)完全性の証明方法

(I) 定義通りに[すべての L]について示す
 (II) すでに完全であることがわかっている問題を利用する

(I)の例: 定理6.7, 定理6.9(≡Cookの定理(SATでTMを模倣))

基本的には...

3SATなどは、形式が一樣なので扱いやすい

1. 多項式時間で動く標準プログラムを考えて
 2. プログラムの動作を命題論理式で模倣する
 →とても大変(手間がかかる)

(II)の例: 例6.4($3\text{SAT} \leq_m^p \text{DHAM}$), 定理6.10, ...

DHAMは一般のグラフ上で $\mathcal{N}\mathcal{P}$ 完全

DHAMは平面グラフに限定しても $\mathcal{N}\mathcal{P}$ 完全
 DHAMは「頂点の次数=3」に限定しても $\mathcal{N}\mathcal{P}$ 完全
 DHAMは2部グラフに限定しても $\mathcal{N}\mathcal{P}$ 完全...

1/11

6.2.2. Proof for completeness

Two ways to prove ($\mathcal{N}\mathcal{P}$ -)completeness

(I) show 'for all L ' according to definition
 (II) use some known complete problems

Ex for (I) : Theorem 6.7,
 Theorem 6.9(≡Cook's Theorem; simulate TM by SAT)

Easy to manipulate since, e.g., 3SAT has a uniform structure.

Basically...

1. For any program in standard form,
 2. simulate it by SAT formulae
 →pretty complicated and tedious

Ex for (II): Example 6.4($3\text{SAT} \leq_m^p \text{DHAM}$), Theorem 6.10, ...

DHAM is $\mathcal{N}\mathcal{P}$ -complete for general graphs

DHAM is $\mathcal{N}\mathcal{P}$ -complete even for planar graphs
 DHAM is $\mathcal{N}\mathcal{P}$ -complete even for graphs with max degree=3
 DHAM is $\mathcal{N}\mathcal{P}$ -complete even for bipartite graphs ...

定理6.10: 以下にあげる集合はすべて \mathcal{NP} -完全

- (1) 3SAT, SAT (ExSATからの還元)
- (2) DHAM, VC (3SATからの還元)
- (3) KNAP, BIN (3SATからの還元と $\text{KNAP} \leq_m^p \text{BIN}$)

(II) \mathcal{NP} 完全性がわかっている問題からの多項式時間還元:

- 1. $3\text{SAT} \leq_m^p \text{VC}$
- 2. $\text{DHAM} \leq_m^p \text{DHAM}$ 頂点の次数が高々5に制限されたDHAM

Vertex Cover: すべての辺の、少なくとも一方の頂点を含む集合
Hamiltonian cycle: すべての頂点を一度ずつ通る閉路

おまけ: DHAMは次数高々3でも \mathcal{NP} 完全。
高々2だと多項式時間で計算可能。

Theorem 6.10 The following sets are all \mathcal{NP} -complete:

- (1) 3SAT, SAT (reduction from ExSAT)
- (2) DHAM, VC (reduction from 3SAT)
- (3) KNAP, BIN (reduction from 3SAT and $\text{KNAP} \leq_m^p \text{BIN}$)

(II) Polynomial time reductions from \mathcal{NP} -complete problems:

- 1. $3\text{SAT} \leq_m^p \text{VC}$
- 2. $\text{DHAM} \leq_m^p \text{DHAM}$ with vertices of degree ≤ 5

Vertex Cover: a vertex set that contains at least one endpoint for each edge
Hamiltonian cycle: a cycle that visits each vertex exactly once

Note : DHAM remains \mathcal{NP} -complete even if max degree 3.
But it is polynomial time solvable if max degree 2.

定理6.10(2): VC は \mathcal{NP} 完全問題

[証明] $\text{VC} \in \mathcal{NP}$ なので, $3\text{SAT} \leq_m^p \text{VC}$ であることを示せばよい。

論理式 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ が与えられたとする。
 F から以下の条件を満たすグラフと自然数の組 $\langle G, k \rangle$ が
多項式時間で構成できることを示す:

F を1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

G の構成(F は n 変数 m 項とする):

- 1. F の各変数 x_i に対し、頂点 x_i^+, x_i^- と、辺 (x_i^+, x_i^-) を加える
- 2. F の各項 $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ に対し、頂点 l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} と辺 $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$ を加える
- 3. 項 C_j のリテラル l_{j1} が x_i のときは辺 (l_{j1}, x_i^+) を、 $\neg x_i$ のときは辺 (l_{j1}, x_i^-) を加える。
- 4. $k = n + 2m$

Theorem 6.10(2) : VC is \mathcal{NP} -complete

[Proof] Since $\text{VC} \in \mathcal{NP}$, we show $3\text{SAT} \leq_m^p \text{VC}$.

For given formula $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, we construct a pair $\langle G, k \rangle$ of a graph and an integer in polynomial time.

There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Construction of G (F has n variables and m clauses):


- 1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
- 2. For each clause $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ in F , add vertices l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} and three edges $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
- 3. add the edge (l_{j1}, x_i^+) if the literal l_{j1} is x_i , or add (l_{j1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
- 4. let $k = n + 2m$

F を1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

G の構成(F は n 変数 m 項とする):

- 1. F の各変数 x_i に対し、頂点 x_i^+, x_i^- と、辺 (x_i^+, x_i^-) を加える
- 2. F の各項 $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ に対し、頂点 l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} と辺 $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$ を加える
- 3. 項 C_j のリテラル l_{j1} が x_i のときは辺 (l_{j1}, x_i^+) を、 $\neg x_i$ のときは辺 (l_{j1}, x_i^-) を加える。
- 4. $k = n + 2m$

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$




There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Construction of G (F has n variables and m clauses):

- 1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
- 2. For each clause $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ in F , add vertices l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} and three edges $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
- 3. add the edge (l_{j1}, x_i^+) if the literal l_{j1} is x_i , or add (l_{j1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
- 4. let $k = n + 2m$

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$



5/11

G の構成は、与えられた F から F のサイズに対する多項式時間で可能。したがって以下を示せばよい:

F を 1 にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

観察:
 G の構成から任意の頂点被覆 S は $\begin{cases} x_i^+, x_i^- \text{ のどちらかを含む} \\ C_j \text{ の 3 頂点中、最低 2 つを含む} \end{cases}$ によって $|S| \geq n+2m = k$ である。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

5/11

It is easy to see that the construction of G from F can be done in polynomial time of the size of F . Hence, we show that...

There is an assignment that makes $F()=1$ $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k

Observation:
 From the construction of G , any vertex cover S should contain $\begin{cases} \text{at least one of } x_i^+ \text{ or } x_i^- \\ \text{at least 2 of 3 vertices in } C_j \end{cases}$
 Hence we have $|S| \geq n+2m = k$.

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

6/11

F を 1 にする割当が存在する $\Rightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

- それぞれの変数 x_i が $\begin{cases} x_i=1 \text{ なら } x_i^+ \text{ を } S \text{ に入れる} \\ x_i=0 \text{ なら } x_i^- \text{ を } S \text{ に入れる} \end{cases}$
- それぞれの項 $C_j = (l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$ は充足されているので、最低 1 つのリテラル (l_{j1}) については変数との間の辺 (l_{j1}, x_{i1}) は x_{i1} によって被覆されている。したがって、それ以外の二つのリテラル (l_{j2}, l_{j3}) を S に入れる。

\Rightarrow **観察** より、 S はサイズ k の頂点被覆になる。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

6/11

If there is an assignment that makes $F()=1$, G has a vertex cover of size k

- Put $\begin{cases} x_i^+ \text{ if } x_i=1 \\ x_i^- \text{ if } x_i=0 \end{cases}$ into S for each x_i .
- Since each clause $C_j = (l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$ is satisfied, say l_{j1} , the edge (l_{j1}, x_{i1}) is covered by the variable x_{i1} . Therefore, put the remaining literals (l_{j2}, l_{j3}) into S .

\Rightarrow From the **Observation**, S is a vertex cover of size k .

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

7/11

G がサイズ k の頂点被覆を持つ $\Rightarrow F$ を 1 にする割当が存在する

- 観察** より、被覆 S は項から $2m$ 個、変数から n 個の頂点を含む。
- さらに各変数 x_i については x_i^+ か x_i^- の一方しか、各項 C_j についてはちょうど 2 つの頂点しか S に含むことができない。
- よって各項 C_j は S に含まれないリテラル l_i を含むが、これに付随する辺は他方が被覆されていなければならない。
 $\Rightarrow \begin{cases} x_i^+ \text{ が } S \text{ に含まれるなら } x_i=1 \\ x_i^- \text{ が } S \text{ に含まれるなら } x_i=0 \end{cases}$ という割当は F を充足する。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

QED.

7/11

If G has a vertex cover of size k , there is an assignment s.t. $F()=1$

- From **Observation**, a cover S contains $2m$ vertices from the clauses, and n vertices from the variables.
- Thus the cover S contains exactly one of x_i^+ and x_i^- and exactly two literals of a clause C_j .
- Hence each clause C_j contains exactly one literal l_i which is not in S , and hence incident edge should be covered by a variable vertex.
 \Rightarrow The following assignment satisfies F : $\begin{cases} x_i=1 \text{ if } x_i^+ \text{ in } S \\ x_i=0 \text{ if } x_i^- \text{ in } S \end{cases}$

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

QED.

8/11

充足できない例:

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$

G

$k = 3 + 2 \times 4 = 11$

充足できない F では、どのリテラルも頂点でカバーされていない項が必ず存在する。この項のリテラルは3つとも Vertex Cover に入れざるを得ない。よって Vertex Cover のサイズは $k+1$ 以上になる。

8/11

Unsatisfiable example:

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$$

G

$k = 3 + 2 \times 4 = 11$

When F is unsatisfiable, it contains at least one clause such that each literal is not covered by a vertex. So, Vertex Cover should contain three literals in the clause. Hence any vertex cover has size at least $k+1$.

9/11

定理: 次数高々5の有向グラフ上の DHAM は \mathcal{NP} 完全問題

[証明] (上記の問題を $\text{DHAM}_{\leq 5}$ と略記する)

DHAM_{≤5} が \mathcal{NP} に属するのは、DHAM が \mathcal{NP} に属することから自明。したがって完全性を示せばよい。DHAM_{≤ m} \leq^p DHAM_{≤5} を示す。

度数: 頂点に付随する辺の本数

アイデア:

次数14の頂点 v (左の) (入ってくる辺集合)と (出ていく辺集合)を右図の 'gadget' で置き換える

左図で v を1度だけ通る閉路と右図で v を1度だけ通る閉路は対応する。

9/11

Theorem: DHAM on a directed graph with max. degree=5 (abb. DHAM_{≤5}) is \mathcal{NP} -complete

[Proof]

Since DHAM $\in \mathcal{NP}$, DHAM_{≤5} $\in \mathcal{NP}$. We DHAM_{≤ m} \leq^p DHAM_{≤5}.

degree: the number of edges incident to a vertex

Idea:

Replace the set of "arcs to v " and the set of "arcs from v " by a right 'gadget'.

A Hamiltonian cycle through v on the original graph corresponds to the Hamiltonian cycle through v on the resultant graph.

10/11

定理: 次数高々5の有向グラフ上の DHAM は \mathcal{NP} 完全問題

アイデア:

ポイント:

- 各閉路は上から下
- 各頂点は次数 ≤ 5

高さ: $O(\log d_i)$
 個数: $O(d_i)$

[証明(概要)]

与えられたグラフ G の次数が6以上のそれぞれの頂点に入る辺と出る辺を上記の gadget で置き換える。

- 元のグラフ G が n 頂点 m 辺であったなら、gadget で置き換えたあとのグラフ G' は $O(n+m)$ 頂点 $O(m)$ 辺となる。したがって上記の還元は G の大きさの多項式時間で可能。
- また G' のすべての頂点は次数はたかだか5である。
- G がハミルトン閉路をもつ $\Leftrightarrow G'$ がハミルトン閉路を持つ QED.

10/11

Theorem: DHAM on a directed graph with max. degree=5 (abb. DHAM_{≤5}) is \mathcal{NP} -complete

Idea:

Points:

- Up to down via cycle
- Each vertex has deg ≤ 5

height: $O(\log d_i)$
 number: $O(d_i)$

[Proof (sketch)]

For each vertex v of degree ≥ 6 , replace the edges around v by the gadget.

- If the original graph G has n vertices with m edges, the resultant graph G' contains $O(n+m)$ vertices with $O(m)$ edges. Hence the reduction can be done in polynomial time of n & m .
- Each vertex in G' has degree at most 5.
- G has a Hamiltonian cycle $\Leftrightarrow G'$ has a Hamiltonian cycle. QED.

おまけ(Addition)

- Ryuhei Uehara, Shigeki Iwata:
Generalized Hi-Q is \mathcal{NP} -complete,
The Transactions of the IEICE, E73, p.270-273, 1990.
- Peisen Zhang, Huitao Sheng, Ryuhei Uehara:
A Double Classification Tree Search Algorithm for
Index SNP Selection, *BMC Bioinformatics*, 5:89, 2004.
- Sachio Teramoto, Erik D. Demaine, Ryuhei Uehara:
Voronoi Game on Graphs and Its Complexity,
2nd IEEE Symp. on Computational Intelligence and Games,
p.265-271, 2006.
- Ryuhei Uehara, Sachio Teramoto:
Computational Complexity of a Pop-up Book,
*4th International Conference on Origami in Science,
Mathematics, and Education*, 2006.
- Ryuhei Uehara:
Simple Geometrical Intersection Graphs,
3rd Workshop on Algorithms and Computation,
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4921, p.25-33, 2008.

多くの自然な問題は
• 多項式時間で解けるか
• \mathcal{NP} 困難か
のどちらかである場合が多い(?)

残りの予定(Schedule)

- 4/24 (Thu):
 - レポートの回収(report submission)
- 4/24 Office Hour:
 - レポートの解答と解説(Answers and comments for the report)
- 4/28: 休講(Canceled)
- 5/1: 中間試験(Mid term exam)
 - 4題40点満点
 - 持ち込み不可(No text, No notes, ...)